

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ Η΄ ΑΙΜΑ

ΒΗΜΑ 1

<u>A/ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ</u>	<u>B/ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ</u>
<u>ΔΕΡΜΑ:</u> - ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΓΗ ΝΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΗΣΕΙ	· ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
- <u>ΟΧΙ ΠΙΕΣΗ Η΄ ΤΡΙΒΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΗ</u>	· ΤΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΝΕΛ)
- <u>ΑΜΕΣΟ ΞΕΠΛΥΜΑ</u> ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ	· ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
<u>ΜΑΤΙ:</u> - <u>ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟ ΞΕΠΛΥΜΑ</u> ΜΕ ΣΤΕΙΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ Η΄ ΑΦΘΟΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ	· ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
<u>ΣΤΟΜΑ/ ΜΥΤΗ:</u> - <u>ΞΕΠΛΥΜΑ</u> ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ	· ΤΟΝ ΕΦΗΜ. ΝΟΣΗΛ/ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ/ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ)

ΒΗΜΑ 2 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ HBV, HCV, HIV

<u>ΓΝΩΣΤΗ ΠΗΓΗ (ΑΣΘΕΝΗΣ)</u>	<u>ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΗΓΗ</u>
<u>ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ HBV, HCV, HIV</u>	<u>ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ HBV, HCV, HIV</u>
ΟΧΙ: ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	
ΝΑΙ: ΒΗΜΑ 3	ΝΑΙ: ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ HBV, HCV, HIV

<u>ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΑ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) :</u>			
<u>ΑΣΘΕΝΗΣ:</u>	- HbsAg	- Anti-HCV	-Anti-HIV
<u>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:</u>	-HbsAg	-Anti-HBs	-Anti-HCV -Anti-HIV -ALT (SGPT)

ΒΗΜΑ 4: ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ HBV, HCV, HIV

<u>ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β:</u>		
<u>ΑΣΘΕΝΗΣ</u>	<u>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ</u>	<u>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</u>
HBsAg (-)	HBsAg (-)	ΚΑΜΙΑ
HBsAg (+)	HBsAg (-) / Anti-HBs \geq 10 IU/ml	ΚΑΜΙΑ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ)
HBsAg (+)	HBsAg (+)	ΕΠΑΓΓ. ΥΓΕΙΑΣ= ΦΟΡΕΑ → ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ
HBsAg (+)	HBsAg (-)/ Anti-HBs \leq 10 IU/ml	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΕΣΑ Γ-ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (HBIC)* ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

(* **HBIC:** ΕΝΔΟΜΥΚΑ ΑΜΕΣΩΣ Η΄ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΣΕ 1ΒΔΟΜΑΔΑ/ Η 2^Η ΔΟΣΗ ΣΕ 1 ΜΗΝΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΞΕΚΙΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕ HBIC ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C:

<u>ΑΣΘΕΝΗΣ</u>	<u>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ</u>	<u>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</u>
Anti-HCV (+)	Anti-HCV (+) / ALT (SGPT)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ (ΗΠΑΤΟΛΟΓΟ)
Anti-HCV (+)	Anti-HCV (-)/ALT (SGPT)	ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Anti-HCV ΚΑΙ ALT (SGPT) ΣΕ 4-6 ΜΗΝΕΣ Η΄/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ HCV-RNA ΣΕ 6 ΒΔΟΜΑΔΕΣ

HIV:

<u>ΑΣΘΕΝΗΣ</u>	<u>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ</u>	<u>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</u>
HIV (±) <i>άγνωστος/ ύποπτος/ βαθύ τραύμα</i>	HIV (-)	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΝΤΟΣ 24-36 ΩΡΩΝ)/ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟ
HIV (+)	HIV (+)	ΑΜΕΣΑ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ

(* **ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ HIV ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 0, 6, 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 6ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ**

ΒΗΜΑ 5: ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ